

Amino Total

Bitkisel Menpeli Aminoasit çeren Organik Gbre

Amino Total kimyasal iþlem grmeden ve kimyasal katkı maddesi eklenmeden, fiziksel ve biyolojik iþlemlerle elde edilmiþtir. Tamamen dođal ve organik bir rndr. çeriđinde 17 çeþit amino asit bulunmaktadır. Amino Total'in ierisindeki Amino L formundadır.

- Amino Total bitkide etkili bir biimde verim artıþı sađlar. Bitki topraktan ve diđer gbrelerden aldyđy besini bymesi ve geliþimini kullanır.
- Amino Total'in ieriđinde bulunan amino asitler bitkide klorofil miktarını arttırır. Artan klorofil miktarı ile bitki daha ok fotosentez yapar. Bylece bitki daha fazla besin maddesi oluþturabilmektedir.
- L ‐ Aspartic asit hcrede enerji retimini sađlamakta, bylece bitki daha gçl byyebilmektedir.
- L ‐ Threonine bađıþıklık sistemini gçlendirir, bitki hastalıklarına, zararlılara ve diđer olumsuz koþullara karşı direni sađlar.
- L ‐ Gysine bitkiye verilen fakat bitkinin yararlanamadıđy besinlerin þelat formuna dnþmesini sađlar.
- L ‐ Methionine bitkideki etilen hormonunun artmasını sađlar. Bu da meyvelerin daha erken olgunlaþmasını ve kk bymesini arttırır.
- L ‐ Lysine iekteki tozlanmayı kolaylaþtırmakta, meyve tutum oranlarını arttırmaktadır.
- L ‐ Arginine ieklenme dneminde iek oluþmasını dolayısıyla verimi arttırır.
- L ‐ Proline hcre duvarlarının sađlamlaþmasına neden olmakta, bitki daha sađlıklı ve rn daha dayanıklı olmaktadır.
- L ‐ Histidine olgunlaþmayı dzenlemekte rnn albenisini arttırmaktadır.
- Amino Total kullanımı rnn kalitesini arttırır.

çeriđi

Toplam organik madde % 30

Serbest amino asit % 38

Toplam azot % 7

Organik azot % 5.2

pH 4 ‐ 6

Kullanıdyđy rnler, Zamanlama ve Oranlar

UYGULAMA ZAMANI

MÝKTAR

(gr / da)

Pekerpancarý

Ýlk

3–5 yapraklý döneminde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Ayçiçeði

Ýlk

3–5 yapraklı döneminde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Pamuk

Ýlk

3–5 yapraklı döneminde

40

Ýkinci

Tarakta

50

Üçünü

Çiçeklenme döneminde

50

Mırsır

Ýlk

Bitki 30cm olduđunda

40

Ýkinci

Püskül oluřum öncesi

60

Tütün

Ýlk

3–5 yapraklý döneminde

40

Ýkinci

Çiçeklenme baþlangýcýnda

50

Devamýnda

Her 4 haftada

60

Soya

Ýlk

Çiçeklenme öncesinde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Kolza(Kanola)

Ýlk

3–5 yapraklý döneminde

40

Ýkinci

Çiçeklenme öncesinde

60

Baklagiller

Yık

Çiçeklenme öncesinde

40

Yerfıstıyđı

Ykinci

3 hafta sonra

50

Patates

Ýlk

Çiçeklenme öncesinde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

50

Hububat

Ýlk

3-5 yapraklý dönemde

40

Ýkinci

Ot ilacı ile

40

Veya

Ot ilacı ile birlikte bir kez

80

Kimyon

Ýlk

Çiçeklenme öncesinde

40

Ýkinci

3 hafta sonra

50

Kavun

Ýlk

3–5 yapraklý dönemde

40

Karpuz

Ýkinci

Çiçeklenme döneminde

50

Üçüncü

Meyve 100g olduđunda

60

Çilek

Ýlk

Bapýrtma sýrasýnda

40

Ýkinci

Çiçeklenme öncesinde

50

Sonraki

Her 3 haftada

60

Perbetçiotu

Ýlk

Büyümenin ortasında

30

Ýkinci

3 hafta sonra

40

Üçüncü

3 hafta sonra

50

Turunçgiller

Yık

Çiçeklenme döneminde

40

Ykinci

Meyve oluđuunda

50

Üçüncü

3 hafta sonra

50

Üzüm

Yık

Sürgün 30cm olduğunda

40

Ykinci

Çiçeklenme öncesi

40

Üçüncü

Çiçeklenme sonrası

40

Elma-Armut

Yık

Çiçeklenme sonrası

50

Ykinci

Meyve oluĐtuĐunda

60

Erik-Kiraz

Yık

Çiçeklenme döneminde

50

Peftali-Kayısý

Ýkinci

3 hafta sonra

60

Zeytin-Ceviz

Ýlk

Sürgün 10cm olduđunda

40

Ýkinci

Hasattan 3 hafta önce

50

Muz

Yık

Yıkbaharda büyüme başladığında

40

Ykinci

3 hafta sonra

50

Üçüncü

3 hafta sonra

50

Yncir

Yık

Yıkbaharda büyüme başladığında

60

Ykinci

3 hafta sonra

60

Nar-Kivi

Yık

Çiçeklenme öncesi

40

Ykinci

ieklenme sonrası

50

Domates

lk

3-5 yapraklý dneminde

40

kinci

ieklenme baþlangıcynda

50

Sonraki

Her 3 haftada

50

Patlýcan

Ýlk

3-5 yapraklý dneminde

40

Biber

Ýkinci

ieklenme baþlangýcýnda

60

nc

Ýlk meyve olupumunda

60

Sonraki

Her 3 haftada

50

Karnabahar

Yık

3-5 yapraklı döneminde

40

Brokoli-Lahana

Ykinci

3 hafta sonra

50

nc

Boþ oluþumu sýrasýnda

50

Marul

Ýlk

3-5 yapraklý dneminde

40

Ýkinci

2 hafta sonra

40

Salatalýk –Acur

Ýlk

3-5 yapraklı d¼neminde

30

Ýkinci

Çiçeklenme d¼neminde

30

Sonraki

Her 2 haftada

40

Sođan-Pýrasa

Ýlk

Çimlenmeden 2-3 hafta sonra

30

Havuç –Turp

Sonraki

Her 2 haftada

40

Enginar

Ýlk

Bitki 30cm olduđunda

40

Ýkinci

Baę oluřumunda

50

Maydanoz

Yık

3-5 yapraklı döneminde

60

Ykinci

3 hafta sonra

60

Üçüncü

Yık kesimde

60

Yonca-Korunga

Her biçimden sonra

40

Fi

Ýlk ykýptan 1 ay sonra

60

Kesme iek

Ýlk

Dikimde

50

Ýkinci

10 gn sonra

50

Sonraki

Her 10 gnde

50

Çim

Ýlk

Mayıs baþýnda

30

Ýkinci

Temmuzun ortasýnda

40

nc

Eylln ortasýnda

50

SERACILIK

MÝKTAR

Uygulama

Zamaný

Yapraktan

Damlama ile

Ýlk

Dikimde

60 g / da

200 (100ltsu/g)

Ýkinci

2 hafta sonra

60 g / da

200 (100ltsu/g)

Sonraki

Her 10 günde

60 g / da

200 (100ltsu/g)

Ambalaj 400 gr