

DAVY AGROZINC

ÝTHAL

ÇÝNKO TUZU (ÇÝNKO SÜLFAT ÝÇERÝKLÝ)

Ýçeriđi

Çinko (Zn): % 20

Kullanýldýđý Ürünler, Zamanlama ve Oranlar

ÜRÜN

DOZ

UYGULAMA ZAMANI

Buđday, Arpa, Yer Fýstýđý, Soya, Mýsýr, Fasulye, Bezelye, Çeltik, Pamuk, Ayçiçeđi, Bekerpancarý, Patates, Bađ

Yapraktan

100-200 gr/da

Ekimden hemen önce her yýl uygulanýr.

Yaprak uygulamasý; bitkide yeterli yaprak geliptiđinde

(erken devrede) uygulanýr.

Noksanlýk belirtisigörülmeden uygulanmalýdır.

Narenciye

Yapraktan

100-200 gr/100 lt su ile

Baharda yeni sürgünler uygulanır.

Gerekirse tekrarlanır.

Çiçeklenme döneminde ve hasattan

hemen önce uygulanmaz

Zeytin

Yapraktan

150 gr/ 100 lt su ile

Yılk baharda uyanma ile birlikte uygulanır

Gerekirse tekrarlanır.

Çiçeklenme

döneminde ve hasattan hemen önce

uygulanmaz.

Elma, Armut, Kayısı, Kiraz, Beftali, Erik

Yapraktan

100 gr/100 lt.su ile

Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır.

Hasattan sonra tekrarlanır.

Sebzeler

Yapraktan

Çiçeklenme başlangıcından hemen sonra

15-20 gün ara ile 2-3 kez yapraktan uygulanır.

Antep Fıstıđı, Ceviz

Yapraktan

100 gr/100 lt su ile

Meyve tutumundan sonra

Ambalaj 1 kg